

# trvalé následky úrazu.

## Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

### Co musí trvalý následek splňovat

Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci. Trvalý následek úrazu musí být po svém ustálení posouzen lékařem (ve většině případů nejdříve 12 měsíců od úrazu, vždy nejpozději 36 měsíců od úrazu) a doložen vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami. V případě fyzické ztráty může lékař trvalý následek úrazu posoudit i dříve. Například amputaci může lékař posoudit ihned, ale v případě omezení funkčnosti kloubu to může být nejdříve za 12 měsíců od úrazu.

### Jak stanovíme výši pojistného plnění

Pojistné plnění stanovíme tak, že pojistnou částku vynásobíme oceněním stanoveným podle Oceňovací tabulky a koeficientem progresu stanoveným podle Tabulky koeficientů progresu. Pro trvalé následky úrazu, které v tabulce nejsou uvedeny, stanovíme ocenění podle trvalého následku úrazu, který v tabulce uveden je a svou povahou a závažností je mu nejvíce podobný. Na trvalé následky úrazu, které v tabulce nejsou uvedeny, ale je v ní uvedena jejich závažnější forma, se však pojistné krytí nevztahuje (například deformace nosu bez funkční poruchy nebo částečná ztráta čichu nebo chuti).

Aby si Oceňovací tabulka zachovala přehlednost a přijatelný rozsah, jsou ocenění některých trvalých následků úrazu uvedené určitým rozpětím (intervalem). V těchto případech stanovíme ocenění trvalého následku tak, aby v rámci daného intervalu odpovídalo jeho závažnosti (v tabulce k těmto intervalům uvádíme příklady  i s jejich přesným oceněním v rámci daného intervalu).

### Jaký je postup v případě několika trvalých následků

Zanechá-li jeden úraz více trvalých následků, jednotlivá ocenění těchto trvalých následků sečteme. Součet ocenění trvalých následků jednoho úrazu však může být nejvýše 100 %. Součet ocenění několika trvalých následků úrazu jedné části těla nemůže být vyšší než ocenění úplné ztráty této části těla. Týká-li se trvalý následek úrazu části těla, která byla poškozena již před úrazem, sníží se ocenění o hodnotu odpovídající ocenění předcházejícího poškození. V ocenění za úplnou ztuhlost, omezení funkčnosti a porušení nervů jsou již zahrnuty oběhové a trofické poruchy (například svalová atrofie při omezené hybnosti končetiny apod.).

### Co rozumíme následujícími pojmy

#### Lehké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o 10–33 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného sevření do dlaně alespoň 1 cm, ale méně než 3 cm) nebo jakékoli omezení funkčnosti kloubu způsobené trvalým poškozením jeho měkkých tkání

#### Středně těžké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o 34–66 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného sevření do dlaně alespoň 3 cm, ale méně než 4 cm)

#### Těžké omezení funkčnosti kloubu

omezení pohyblivosti kloubu o více než 66 % ve všech rovinách pohybu v porovnání s běžným rozsahem pohybu (v případě prstů ruky chybí do úplného sevření do dlaně alespoň 4 cm)

# Oceňovací tabulka

## Hlava a krk

| Položka | Trvalý následek úrazu   | Ocenění v % |
|---------|---|-------------|
| 1       | lehké neurologické poruchy po poranění hlavy  | 0–15        |
|         | ◇ mozková komoče, krvácení do mozku nebo kontuze mozku (vše bez trvalých neurologických poruch), epilepsie, postkomoční syndrom | 0           |
|         | ◇ jednostranné poškození přídatného nebo rovnovážného nervu   | 10          |
|         | ◇ oboustranné ochrnutí měkkého patra  | 15          |
| 2       | středně těžké neurologické poruchy po poranění hlavy  | 20–55       |
|         | ◇ oboustranné poškození podjazykového nebo přídatného nervu, monoparéza   | 20          |
|         | ◇ hemiparéza, středně těžký prefrontální syndrom  | 30          |
| 3       | těžké neurologické poruchy po poranění hlavy  | 60–100      |
|         | ◇ těžký prefrontální syndrom, monoplegie  | 70          |
|         | ◇ trvalá umělá plicní ventilace   | 80          |
|         | ◇ hemiplegie, apalický syndrom  | 100         |
| 4       | úplný defekt v klenbě lebni   | 1–25        |
|         | ◇ v rozsahu 0,5 cm <sup>2</sup>   | 1           |
|         | ◇ v rozsahu 15 cm <sup>2</sup> nebo více  | 25          |
| 5       | úplná ztráta zraku jednoho oka  | 35          |
| 6       | částečná ztráta zraku jednoho oka (pouze světlocit)   | 30          |
| 7       | částečná ztráta zraku jednoho oka (neostré vidění lepší než světlocit)  | 5–20        |
|         | ◇ s optimální brýlovou korekcí – vizus 0,7  | 5           |
|         | ◇ s optimální brýlovou korekcí – vizus 0,05   | 15          |
|         | ◇ schopnost spočítat prsty pouze do vzdálenosti max. 1 m před okem  | 20          |
| 8       | úplná ztráta zraku obou očí   | 100         |
| 9       | částečná ztráta zraku obou očí (pouze světlocit)  | 95          |
| 10      | částečná ztráta zraku obou očí (neostré vidění lepší než světlocit)   | 5–85        |
|         | ◇ s optimální brýlovou korekcí - vizus 0,8 (obě oči)  | 5           |
|         | ◇ s optimální brýlovou korekcí - vizus 0,3 (obě oči)  | 30          |
|         | ◇ s optimální brýlovou korekcí - vizus 0,01 (obě oči)   | 81          |
|         | ◇ schopnost spočítat prsty pouze do vzdálenosti max. 1 m před očima   | 85          |
| 11      | zúžení zorného pole jednoho oka (včetně poklesu očního víčka)   | 0–25        |
|         | ◇ zelený zákal, koncentrické zúžení k 50°   | 0           |
|         | ◇ koncentrické zúžení k 30°   | 15          |
|         | ◇ koncentrické zúžení k 5°  | 25          |
| 12      | zúžení zorného pole obou očí (včetně poklesu očních víček)  | 10–90       |
|         | ◇ zelený zákal (obě oči)  | 0           |
|         | ◇ koncentrické zúžení k 60° (obě oči)   | 10          |
|         | ◇ koncentrické zúžení k 30° (obě oči)   | 45          |
|         | ◇ koncentrické zúžení k 5° (obě oči)  | 90          |

| Položka | Trvalý následek úrazu   | Ocenění v % |
|---------|---|-------------|
| 13      | úplná ztráta čočky jednoho oka  | 5–25        |
|         | ◇ se snášenlivostí kontaktní čočky alespoň 8 hodin  | 5           |
|         | ◇ se snášenlivostí kontaktní čočky alespoň 4–8 hodin (do 45 let/jinak)                        | 15/10       |
|         | ◇ se snášenlivostí kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně (do 45 let/jinak)                  | 20/15       |
|         | ◇ s úplnou nesnášenlivostí kontaktní čočky (do 45 let/jinak)                                  | 25/20       |
| 14      | poškození zornice jednoho oka s funkční poruchou  | 0–10        |
|         | ◇ nepravidelný tvar až úplný zánik zornice z důvodu ztráty méně než 1 % duhovky               | 0           |
|         | ◇ nepravidelný tvar až úplný zánik zornice z důvodu ztráty 1–14 % duhovky                     | 5           |
|         | ◇ rozšíření nebo ochrnutí zornice   | 5           |
|         | ◇ nepravidelný tvar až úplný zánik zornice z důvodu ztráty víc než 50 % duhovky               | 10          |
| 15      | porušení průchodnosti slzných cest jednoho oka  | 5–10        |
|         | ◇ v oblasti horního víčka   | 5           |
|         | ◇ v oblasti dolního víčka   | 10          |
| 16      | nesprávné postavení očních víček na jednom oku, které nelze operativně odstranit              | 0–15        |
|         | ◇ změna tvaru oční štěrbinu jednoho oka bez poruchy ochranné funkce oka a bez dráždění řasami | 0           |
|         | ◇ oční víčko odvrácené od oka   | 5           |
|         | ◇ oční víčko stočené k oku  | 15          |
| 17      | nedovírání jednoho očního víčka (lagofthalmus), které nelze operativně odstranit              | 2–10        |
|         | ◇ lagofthalmus do 3 mm  | 2           |
|         | ◇ lagofthalmus 3–7 mm   | 5           |
|         | ◇ lagofthalmus nad 7 mm   | 10          |
| 18      | těžké kosmetické defekty jednoho oka  | 5–25        |
|         | ◇ ptóza očního víčka, pokud nekryje zornici   | 5           |
|         | ◇ deformace očnice  | 10          |
|         | ◇ srůsty spojivky, chybějící duhovka  | 15          |
|         | ◇ rohovková protéza po poleptání oka  | 25          |
| 19      | poškození trojklanného nervu  | 5–15        |
|         | ◇ poškození jedné větve   | 5           |
|         | ◇ poškození dvou větví  | 10          |
|         | ◇ poškození tří větví   | 15          |
| 20      | poškození okohybných nervů  | 5–25        |
|         | ◇ lehké poškození   | 5           |
|         | ◇ dvojité vidění jen při určitém úhlu pohledu   | 15          |
|         | ◇ dvojité vidění svisle nebo vodorovně  | 25          |
| 21      | poškození lícního nervu   | 10–15       |
|         | ◇ lehké poškození   | 10          |
|         | ◇ středně těžké poškození   | 12          |
|         | ◇ těžké poškození   | 15          |

| Položka | Trvalý následek úrazu   | Ocenění v % |
|---------|---|-------------|
| 22      | úplná nebo částečná ztráta nosu (včetně ztráty čichu nebo chuti) nebo jeho deformace s funkční poruchou                         | 5–20        |
|         | ◇ částečná ztráta bez poruchy průchodnosti  | 5           |
|         | ◇ částečná ztráta s těžkou poruchou průchodnosti  | 10          |
|         | ◇ úplná ztráta bez poruchy dýchání  | 15          |
|         | ◇ úplná ztráta s poruchou dýchání   | 20          |
| 23      | perforace nosní přepážky  | 5           |
| 24      | úplná ztráta čichu nebo chuti   | 10          |
| 25      | úplná nebo částečná ztráta sluchu jednoho ucha  | 0–15        |
|         | ◇ lehká ztráta do 40 dB   | 0           |
|         | ◇ středně těžká ztráta 41–60 dB   | 5           |
|         | ◇ těžká ztráta 61–95 dB   | 12          |
|         | ◇ úplná ztráta  | 15          |
| 26      | úplná nebo částečná ztráta sluchu obou uší  | 5–40        |
|         | ◇ tinnitus (obě uši)  | 0           |
|         | ◇ lehká ztráta 26–40 dB (obě uši)   | 5           |
|         | ◇ středně těžká ztráta 41–60 dB (obě uši)   | 20          |
|         | ◇ těžká ztráta 61–95 dB (obě uši)   | 35          |
|         | ◇ úplná ztráta (obě uši)  | 40          |
| 27      | perforace ušního bubínku  | 5           |
| 28      | úplná ztráta jednoho ušního boltce  | 10          |
| 29      | úplná ztráta obou ušních boltců   | 15          |
| 30      | úplná nebo částečná ztráta jazyka (včetně ztráty chuti nebo mluvení)  | 0–40        |
|         | ◇ lehká deformace jazyka bez ztráty chuti a mluvení   | 0           |
|         | ◇ ztráta méně než čtvrtiny jazyka   | 5           |
|         | ◇ ztráta poloviny jazyka  | 25          |
|         | ◇ úplná ztráta jazyka   | 40          |
| 31      | ztráta celého zubu nebo jeho části, pokud vede ke ztrátě jeho vitality  | 2           |
| 32      | ztráta části zubu, která nevede ke ztrátě jeho vitality, nebo ztráta či poškození dočasných (mléčných) zubů nebo zubních náhrad | 0           |
| 33      | jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění obličeje  | 10–40       |
|         | ◇ omezení pohyblivosti čelisti s možností oddálení čelistí do 1 cm  | 10          |
|         | ◇ deformace rtů s trvalým výtokem slin  | 25          |
|         | ◇ ztráta více jak poloviny dolní čelisti  | 40          |
| 34      | úplná nebo částečná ztráta hlasu nebo mluvení po poranění hlasivek  | 10–25       |
|         | ◇ částečná ztráta hlasu, poruchy hlasu  | 10          |
|         | ◇ úplná ztráta hlasu nebo mluvení   | 25          |
| 35      | trvalá tracheostomie  | 50          |
| 36      | zúžení hrtanu nebo průdušnice (včetně ztráty hlasu nebo mluvení po poranění hlasivek a tracheostomie)                           | 15–65       |
|         | ◇ lehké zúžení bez ztráty hlasu a mluvení   | 15          |
|         | ◇ středně těžké zúžení se ztrátou hlasu nebo mluvení  | 30          |
|         | ◇ těžké zúžení s trvalou tracheostomií  | 65          |

## Trup

| Položka | Trvalý následek úrazu   | Ocenění v % |
|---------|---|-------------|
| 37      | úplná nebo částečná ztráta jednoho prsu   | 0–15        |
|         | ◇ částečná ztráta u muže  | 0           |
|         | ◇ částečná ztráta u ženy ve věku 46 let nebo vyšším                                       | 5           |
|         | ◇ částečná ztráta u ženy ve věku 45 let nebo nižším                                       | 10          |
|         | ◇ úplná ztráta u ženy   | 15          |
| 38      | omezení pohyblivosti hrudníku se srůsty plic a hrudní stěny                               | 5–20        |
|         | ◇ lehké omezení   | 5           |
|         | ◇ středně těžké omezení   | 15          |
|         | ◇ těžké omezení   | 20          |
| 39      | jiný trvalý následek po poranění jedné plíce  | 15–40       |
|         | ◇ lehké omezení funkce do 10 %  | 15          |
|         | ◇ středně těžké omezení funkce 10–25 %  | 30          |
|         | ◇ těžké omezení funkce nad 25 %   | 40          |
| 40      | jiný trvalý následek po poranění obou plic  | 25–100      |
|         | ◇ lehké omezení funkce do 25 %  | 25          |
|         | ◇ středně těžké omezení funkce 25–80 %  | 60          |
|         | ◇ těžké omezení funkce nad 80 %   | 100         |
| 41      | lehké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním                               | 10–20       |
|         | ◇ komoce nebo kontuze srdce (vše s lehkým poklesem výkonnosti)                            | 10          |
|         | ◇ aortální disekce bez rozšíření aory a bez orgánové dysfunkce                            | 20          |
| 42      | středně těžké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním                       | 25–45       |
|         | ◇ trhlina srdečního svalu se středně těžkým poklesem výkonnosti                           | 25          |
|         | ◇ aortální disekce s rozšířením aorty a s lehkou orgánovou dysfunkcí                      | 45          |
| 43      | těžké srdeční nebo cévní poruchy způsobené přímým poraněním                               | 50–100      |
|         | ◇ srdeční tamponáda, tensní pneumotorax nebo hemotorax (vše s těžkým poklesem výkonnosti) | 50          |
|         | ◇ aortální disekce s těžkou orgánovou dysfunkcí   | 100         |
| 44      | úplná nebo částečná ztráta sleziny  | 0–15        |
|         | ◇ částečná ztráta bez funkční poruchy   | 0           |
|         | ◇ částečná ztráta s lehkou funkční poruchou   | 2           |
|         | ◇ částečná ztráta se středně těžkou funkční poruchou                                      | 5           |
|         | ◇ částečná ztráta s těžkou funkční poruchou   | 10          |
|         | ◇ úplná ztráta  | 15          |
| 45      | zúžení jícnu  | 10–60       |
|         | ◇ lehké zúžení  | 10          |
|         | ◇ středně těžké zúžení  | 30          |
|         | ◇ těžké zúžení  | 60          |
| 46      | píštěl jícnu  | 30          |
| 47      | porušení funkce břišní stěny s poruchou břišního lisu                                     | 20          |
| 48      | kýla  | 0           |

| Položka | Trvalý následek úrazu  | Ocenění v % |
|---------|--|-------------|
| 49      | <b>jiný trvalý následek po poranění trávicích orgánů</b>   | 10–100      |
|         | ◇ ztráta části jater s lehkou funkční poruchou   | 10          |
|         | ◇ částečná nedomykavost řitních svěračů  | 15          |
|         | ◇ poškození slinivky s funkční poruchou  | 20          |
|         | ◇ ztráta části jater s těžkou funkční poruchou   | 40          |
|         | ◇ úplná nedomykavost řitních svěračů, trvalá kolostomie  | 60          |
|         | ◇ trvalá ileostomie  | 80          |
| 50      | <b>úplná nebo částečná ztráta funkce jedné ledviny</b>   | 0–25        |
|         | ◇ částečná ztráta funkce s lehkou funkční poruchou   | 0           |
|         | ◇ částečná ztráta funkce s středně těžkou funkční poruchou   | 10          |
|         | ◇ částečná ztráta funkce s těžkou funkční poruchou   | 20          |
|         | ◇ úplná ztráta funkce  | 25          |
| 51      | <b>úplná nebo částečná ztráta funkce obou ledvin</b>   | 0–100       |
|         | ◇ bez funkční poruchy  | 0           |
|         | ◇ částečná ztráta funkce s lehkou funkční poruchou (obě ledviny)   | 10          |
|         | ◇ částečná ztráta funkce s středně těžkou funkční poruchou (obě ledviny)   | 40          |
|         | ◇ částečná ztráta funkce s těžkou funkční poruchou (obě ledviny)   | 80          |
|         | ◇ úplná ztráta funkce (obě ledviny)  | 100         |
| 52      | <b>píštěl močového měchýře nebo močové trubice</b>   | 50          |
| 53      | <b>jiný trvalý následek po poranění ledvin nebo močových cest</b>  | 10–50       |
|         | ◇ lehký následek   | 10          |
|         | ◇ středně těžký následek   | 20          |
|         | ◇ těžký následek, trvalá ureostomie  | 50          |
| 54      | <b>lehké poškození pohlavních orgánů</b>   | 0–15        |
|         | ◇ lehká deformace penisu   | 5           |
|         | ◇ lehká deformace pochvy, ztráta jednoho vaječníku   | 10          |
|         | ◇ úplná ztráta dělohy ve věku 46 let nebo vyšším   | 15          |
|         | ◇ úplná ztráta penisu ve věku 60 let nebo vyšším   | 15          |
| 55      | <b>středně těžké poškození pohlavních orgánů</b>   | 20–30       |
|         | ◇ úplná ztráta obou varlat ve věku 46–59 let   | 25          |
|         | ◇ středně těžká deformace pochvy nebo úplná ztráta obou vaječnicků (vše ve věku 46 let nebo vyšším)                | 25          |
|         | ◇ úplná ztráta penisu ve věku 46–59 let  | 30          |
| 56      | <b>těžké poškození pohlavních orgánů</b>   | 35–50       |
|         | ◇ úplná ztráta obou varlat ve věku 45 let nebo nižším  | 40          |
|         | ◇ úplná ztráta obou vaječnicků ve věku 45 let nebo nižším  | 45          |
|         | ◇ úplná ztráta penisu / dělohy ve věku 45 let nebo nižším  | 50          |
| 57      | <b>porušení souvislosti pánevního prstence s lehkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin</b>          | 15–20       |
|         | ◇ ženy do 45 let   | 20          |
|         | ◇ ostatní  | 15          |
| 58      | <b>porušení souvislosti pánevního prstence se středně těžkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin</b> | 25–35       |
|         | ◇ ženy do 45 let   | 35          |
|         | ◇ ostatní  | 25          |

| Položka | Trvalý následek úrazu  | Ocenění v % |
|---------|--|-------------|
| 59      | porušení souvislosti pánevního prstence s těžkou poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin | 40–55       |
|         | ◇ ženy do 45 let   | 55          |
|         | ◇ ostatní  | 40          |
| 60      | lehké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky         | 10–30       |
|         | ◇ lehké omezení pohyblivosti páteře  | 10          |
|         | ◇ paraparéza   | 30          |
| 61      | středně těžké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky | 35–55       |
|         | ◇ středně těžké omezení pohyblivosti páteře  | 35          |
|         | ◇ kvadruparéza   | 55          |
| 62      | těžké poškození páteře, míchy, míšních plen nebo kořenů s trvalými neurologickými příznaky         | 60–100      |
|         | ◇ těžké omezení pohyblivosti páteře  | 60          |
|         | ◇ kvadruplegie, paraplegie   | 100         |

## Horní končetina

| Položka | Trvalý následek úrazu   | Ocenění v % |
|---------|---|-------------|
| 63      | úplná ztráta horní končetiny v loketním kloubu nebo nad ním       | 70          |
| 64      | úplná ztuhlost ramenního kloubu                                   | 30          |
| 65      | lehké omezení funkčnosti ramenního kloubu                         | 5           |
| 66      | středně těžké omezení funkčnosti ramenního kloubu                 | 10          |
| 67      | těžké omezení funkčnosti ramenního kloubu                         | 18          |
| 68      | náhrada ramenního kloubu  | 15          |
| 69      | pakloub pažní kosti   | 40          |
| 70      | viklavost ramenního kloubu  | 10–20       |
|         | ◇ alespoň 3 luxace ramenního kloubu vyžadující repozici lékařem   | 10          |
|         | ◇ 4 luxace ramenního kloubu vyžadující repozici lékařem           | 15          |
|         | ◇ 5 nebo více luxací ramenního kloubu vyžadující repozici lékařem | 20          |
| 71      | nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární                     | 6           |
| 72      | nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární                      | 3           |
| 73      | úplná ztráta horní končetiny mezi loketním kloubem a zápěstím     | 60          |
| 74      | úplná ztuhlost loketního kloubu                                   | 25          |
| 75      | úplná ztuhlost radioulnárních kloubů                              | 20          |
| 76      | lehké omezení funkčnosti loketního kloubu                         | 5           |
| 77      | středně těžké omezení funkčnosti loketního kloubu                 | 12          |
| 78      | těžké omezení funkčnosti loketního kloubu                         | 20          |
| 79      | náhrada loketního kloubu  | 15          |
| 80      | pakloub vřetenní kosti  | 30          |
| 81      | pakloub loketní kosti   | 20          |

| Položka | Trvalý následek úrazu   | Ocenění v % |
|---------|---|-------------|
| 82      | viklavost loketního kloubu  | 15–25       |
|         | ◇ lehké omezení   | 15          |
|         | ◇ středně těžké omezení   | 20          |
|         | ◇ těžké omezení   | 25          |
| 83      | úplná ztráta ruky v zápěstí   | 50          |
| 84      | úplná ztráta palce ruky nebo úplná ztuhlost všech jeho kloubů               | 18          |
| 85      | úplná ztráta koncového článku palce ruky                                    | 7           |
| 86      | úplná ztráta všech prstů ruky kromě palce                                   | 40          |
| 87      | úplná ztráta prstu ruky (kromě palce) nebo úplná ztuhlost všech jeho kloubů | 8           |
| 88      | úplná ztráta dvou článků prstu ruky (kromě palce)                           | 6           |
| 89      | úplná ztráta koncového článku prstu ruky (kromě palce)                      | 3           |
| 90      | úplná ztuhlost zápěstí  | 20          |
| 91      | úplná ztuhlost kloubu palce ruky  | 6           |
| 92      | úplná ztuhlost kloubu prstu ruky (kromě palce)                              | 1           |
| 93      | lehké omezení funkčnosti zápěstí  | 5           |
| 94      | středně těžké omezení funkčnosti zápěstí                                    | 15          |
| 95      | těžké omezení funkčnosti zápěstí  | 18          |
| 96      | lehké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky                                  | 1           |
| 97      | středně těžké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky                          | 3           |
| 98      | těžké omezení funkčnosti kloubu prstu ruky                                  | 6           |
| 99      | náhrada zápěstí   | 15          |
| 100     | náhrada kloubu prstu ruky   | 3           |
| 101     | pakloub člunkové kosti  | 15          |
| 102     | viklavost zápěstí   | 5–15        |
|         | ◇ lehké omezení   | 5           |
|         | ◇ středně těžké omezení   | 10          |
|         | ◇ těžké omezení   | 15          |
| 103     | poškození pažního nervu   | 0–30        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti   | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti   | 3           |
|         | ◇ s částečným poškozením funkce   | 15          |
|         | ◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů                              | 30          |
| 104     | poškození kmene vřetenního nervu  | 0–35        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti   | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti   | 3           |
|         | ◇ s poruchou funkce palcových svalů   | 10          |
|         | ◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů                              | 35          |

| Položka | Trvalý následek úrazu  | Ocenění v % |
|---------|--|-------------|
| 105     | poškození muskulokutánního nervu   | 0–30        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti  | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti  | 3           |
|         | ◇ s částečným poškozením funkce (bez poruchy funkce dvojhlavého pažního svalu) | 15          |
|         | ◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů                                 | 30          |
| 106     | poškození kmene loketního nervu  | 0–35        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti  | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti  | 3           |
|         | ◇ s poškozením pouze distální části nervu                                      | 25          |
|         | ◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů                                 | 35          |
| 107     | poškození kmene středního nervu  | 0–30        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti  | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti  | 3           |
|         | ◇ s poškozením pouze distální části nervu                                      | 15          |
|         | ◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů                                 | 30          |
| 108     | poškození nervů ramenního pletence   | 0–10        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti  | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti  | 1           |
|         | ◇ s poškozením nervů nadklíčkového svazku                                      | 5           |
|         | ◇ s poškozením funkce všech inervovaných svalů                                 | 10          |

## Dolní končetina

| Položka | Trvalý následek úrazu   | Ocenění v % |
|---------|---|-------------|
| 109     | úplná ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo nad ním nebo deformace stehenní kosti s vychýlením od fyziologické normy větším než 45° | 60          |
| 110     | úplná ztuhlost kyčelního kloubu   | 35          |
| 111     | lehké omezení funkčnosti kyčelního kloubu   | 10          |
| 112     | středně těžké omezení funkčnosti kyčelního kloubu   | 20          |
| 113     | těžké omezení funkčnosti kyčelního kloubu   | 30          |
| 114     | náhrada kyčelního kloubu  | 15          |
| 115     | pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice   | 40          |
| 116     | zkrácení dolní končetiny o 1 cm až 4 cm   | 1–5         |
|         | ◇ zkrácení o 1 cm   | 1           |
|         | ◇ zkrácení o 2 cm   | 3           |
|         | ◇ zkrácení o 3 cm   | 4           |
|         | ◇ zkrácení o 4 cm   | 5           |
| 117     | zkrácení dolní končetiny o 4 cm až 6 cm   | 5–15        |
|         | ◇ zkrácení o 4 cm   | 5           |
|         | ◇ zkrácení o 5 cm   | 10          |
|         | ◇ zkrácení o 6 cm   | 15          |

| Položka | Trvalý následek úrazu   | Ocenění v % |
|---------|---|-------------|
| 118     | zkrácení dolní končetiny o 6 cm nebo více   | 15–25       |
|         | ◇ zkrácení o 6 cm   | 15          |
|         | ◇ zkrácení o 7 cm   | 18          |
|         | ◇ zkrácení o 8 cm   | 20          |
|         | ◇ zkrácení o 9 cm   | 23          |
|         | ◇ zkrácení o 10 cm nebo víc   | 25          |
| 119     | deformace stehenní kosti s vychýlením od fyziologické normy 5° až 45°   | 5–60        |
|         | ◇ s vychýlením 5°   | 5           |
|         | ◇ s vychýlením 30°  | 30          |
|         | ◇ s vychýlením 31°  | 32          |
|         | ◇ s vychýlením 45°  | 60          |
| 120     | úplná ztráta dolní končetiny mezi kolenním a hlezenním kloubem nebo deformace kostí bérce s vychýlením od fyziologické normy větším než 45° | 50          |
| 121     | úplná ztuhlost kolenního kloubu   | 25–30       |
|         | ◇ v ohnutí do 20°   | 25          |
|         | ◇ v ohnutí 21–30°   | 27          |
|         | ◇ v ohnutí nad 30°  | 30          |
| 122     | lehké omezení funkčnosti kolenního kloubu   | 8           |
| 123     | středně těžké omezení funkčnosti kolenního kloubu   | 12          |
| 124     | těžké omezení funkčnosti kolenního kloubu   | 25          |
| 125     | náhrada kolenního kloubu  | 15          |
| 126     | pakloub holenní kosti   | 40          |
| 127     | pakloub lýtkové kosti   | 5           |
| 128     | viklavost kolenního kloubu způsobená porušením funkce předního nebo zadního zkříženého vazy   | 10–20       |
|         | ◇ pozitivní Lachman 1. stupně   | 10          |
|         | ◇ pozitivní Lachman 2. stupně   | 15          |
|         | ◇ pozitivní Lachman 3. stupně   | 20          |
| 129     | viklavost kolenního kloubu způsobená porušením funkce postranního vazy  | 5           |
| 130     | porušení funkce kolenního kloubu po operativním odstranění jednoho menisku  | 3           |
| 131     | jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění jednoho menisku   | 2           |
| 132     | jiný trvalý následek s funkční poruchou po poranění obou menisků  | 3           |
| 133     | deformace kostí bérce s vychýlením od fyziologické normy 5° až 45°  | 5–50        |
|         | ◇ vychýlení 5°  | 5           |
|         | ◇ vychýlení 40°   | 40          |
|         | ◇ vychýlení 41°   | 42          |
|         | ◇ vychýlení 45°   | 50          |
| 134     | úplná ztráta nohy v hlezenním nebo v Chopartově kloubu  | 30          |
| 135     | úplná ztráta nohy v Lisfrancově kloubu nebo pod ním   | 25          |
| 136     | úplná ztráta palce nohy se záprstní kostí   | 15          |
| 137     | úplná ztráta palce nohy   | 10          |

| Položka | Trvalý následek úrazu  | Ocenění v % |
|---------|--|-------------|
| 138     | úplná ztráta koncového článku palce nohy   | 3           |
| 139     | úplná ztráta malíku nohy se záprstní kostí   | 10          |
| 140     | úplná ztráta prstu nohy (kromě palce)  | 2           |
| 141     | úplná ztráta dvou článků nebo koncového článku prstu nohy (kromě palce)            | 0           |
| 142     | úplná ztuhlost hlezenního kloubu   | 20–30       |
|         | ◇ v příznivém postavení  | 20          |
|         | ◇ v pravoúhlém postavení   | 25          |
|         | ◇ v nepříznivém postavení  | 30          |
| 143     | úplná ztuhlost mezičláňkového kloubu palce nohy                                    | 3           |
| 144     | úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy  | 7           |
| 145     | úplná ztuhlost kloubu prstu nohy (kromě palce)                                     | 0           |
| 146     | lehké omezení funkčnosti hlezenního kloubu   | 5           |
| 147     | středně těžké omezení funkčnosti hlezenního kloubu                                 | 10          |
| 148     | těžké omezení funkčnosti hlezenního kloubu   | 18          |
| 149     | lehké omezení funkčnosti kloubu palce nohy   | 1           |
| 150     | středně těžké omezení funkčnosti kloubu palce nohy                                 | 3           |
| 151     | těžké omezení funkčnosti kloubu palce nohy   | 6           |
| 152     | lehké, středně těžké nebo těžké omezení funkčnosti kloubu prstu nohy (kromě palce) | 0           |
| 153     | náhrada hlezenního kloubu  | 15          |
| 154     | viklavost hlezenního kloubu  | 0–20        |
|         | ◇ velmi lehké omezení  | 0           |
|         | ◇ lehké omezení  | 5           |
|         | ◇ středně těžké omezení  | 12          |
|         | ◇ těžké omezení  | 20          |
| 155     | deformace kostí hlezenního kloubu nebo nohy  | 0–25        |
|         | ◇ lehká deformace bez funkční poruchy  | 0           |
|         | ◇ plochá noha  | 5           |
|         | ◇ vybočená nebo vbočená noha   | 15          |
|         | ◇ těžká deformace  | 25          |
| 156     | poškození sedacího nervu   | 0–50        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti  | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti  | 5           |
|         | ◇ s částečnou poruchou funkce prstů nohy nebo kotníku                              | 20          |
|         | ◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů                              | 50          |
| 157     | poškození stehenního nervu   | 0–30        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti  | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti  | 3           |
|         | ◇ s poruchou extenze kolene  | 20          |
|         | ◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů                              | 30          |

| Položka | Trvalý následek úrazu   | Ocenění v % |
|---------|---|-------------|
| 158     | poškození obturatorního nervu                                 | 0–20        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti                             | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti                                 | 2           |
|         | ◇ s částečným poškozením funkce všech inervovaných svalů      | 10          |
|         | ◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů         | 20          |
| 159     | poškození kmene nervu holenního                               | 0–35        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti                             | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti                                 | 3           |
|         | ◇ s poruchou funkce prstů                                     | 15          |
|         | ◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů         | 35          |
| 160     | poškození kmene nervu lýtkového                               | 0–30        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti                             | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti                                 | 3           |
|         | ◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů         | 30          |
| 161     | poškození hluboké větve nervu lýtkového                       | 0–20        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti                             | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti                                 | 2           |
|         | ◇ s částečným poškozením funkce všech inervovaných svalů      | 10          |
|         | ◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů         | 20          |
| 162     | poškození povrchové větve nervu lýtkového                     | 0–10        |
|         | ◇ bez poruchy funkce a citlivosti                             | 0           |
|         | ◇ pouze s poruchou citlivosti                                 | 1           |
|         | ◇ s úplným poškozením funkce všech inervovaných svalů         | 10          |
| 163     | pouřazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině | 0–15        |
|         | ◇ chronický zánět kostní dřene                                | 0           |
|         | ◇ trofické poruchy svalstva bérce                             | 3           |
|         | ◇ trofické poruchy svalstva stehna                            | 10          |
|         | ◇ těžká porucha   | 15          |

## Ostatní

| Položka | Trvalý následek úrazu                            | Ocenění v % |
|---------|--|-------------|
| 164     | plošná jizva větší než 0,5 % povrchu těla        | 1–40        |
|         | ◇ od 0,5 % do 1 % povrchu těla                   | 1           |
|         | ◇ od 1 % do 14 % povrchu těla                    | 1–14        |
|         | ◇ od 15 % do 18 % povrchu těla                   | 16–22       |
|         | ◇ od 19 % do 24 % povrchu těla                   | 25–38       |
|         | ◇ 25 % povrchu těla nebo více                    | 40          |
|         | ◇ částečná skalpace hlavy nad 50 % povrchu hlavy | 20          |
|         | ◇ úplná skalpace hlavy                           | 30          |

| Položka | Trvalý následek úrazu  | Ocenění v % |
|---------|--|-------------|
| 165     | hypertrofická nebo keloidní podélná jizva v obličeji nebo na krku delší než 1 cm | 1–20        |
|         | ◇ od 1 cm do 2 cm  | 1           |
|         | ◇ od 3 cm do 7 cm  | 2–6         |
|         | ◇ od 8 cm do 19 cm   | 8–19        |
|         | ◇ 20 cm nebo více  | 20          |
| 166     | hypertrofická nebo keloidní podélná jizva mimo obličej a krk delší než 8 cm      | 1–10        |
|         | ◇ od 8 cm do 10 cm   | 1           |
|         | ◇ od 11 cm do 12 cm  | 2           |
|         | ◇ od 13 cm do 19 cm  | 3–5         |
|         | ◇ od 20 cm do 24 cm  | 6           |
|         | ◇ od 25 cm do 29 cm  | 7           |
|         | ◇ od 30 cm do 34 cm  | 8           |
|         | ◇ od 35 cm do 39 cm  | 9           |
|         | ◇ 40 cm nebo více  | 10          |
| 167     | jiná jizva nebo pigmentační změna  | 0           |

## Tabulka koeficientů progresu

| Ocenění v % | Koeficient progresu |
|-------------|---------------------|
| 0–15        | 1,00                |
| 16–20       | 1,50                |
| 21–30       | 2,00                |
| 31–40       | 3,00                |
| 41–50       | 4,00                |
| 51–60       | 5,00                |
| 61–70       | 6,00                |
| 71–80       | 7,00                |
| 81–90       | 8,00                |
| 91–100      | 10,00               |