

trvalé následky úrazu.

Stanovenie poistného plnenia z poistenia trvalých následkov úrazu

Čo musí trvalý následok spĺňať

Poistné krytie sa vzťahuje výhradne na trvalé následky úrazu, nie choroby. Trvalý následok musí byť po ustálení posúdený lekárom (vo väčšine prípadov najskôr 12 mesiacov od úrazu, vždy však najneskôr 36 mesiacov od úrazu) a potvrdený objektívnymi vyšetrovacími metódami. Ak trvalý následok nie je ustálený ani po uplynutí 36 mesiacov od úrazu, posúdime ho podľa aktuálneho stavu na konci tejto lehoty. V prípade fyzickej straty môže lekár trvalý následok posúdiť aj skôr. Napríklad amputáciu môže lekár posúdiť hneď, ale v prípade obmedzenia funkčnosti kĺbu to môže byť najskôr o 12 mesiacov od úrazu.

Ako stanovíme výšku poistného plnenia

Poistné plnenie stanovíme tak, že poistnú sumu platnú v čase vzniku úrazu vynásobíme percentuálnym ocenením trvalého následku stanoveným podľa Oceňovacej tabuľky a koeficientom progresie stanoveným podľa Tabuľky koeficientov progresie.

Poistné krytie sa vzťahuje aj na trvalé následky neuvedené v Oceňovacej tabuľke. Výnimkou sú trvalé následky, pri ktorých je v tabuľke uvedená ich závažnejšia forma, na tie sa poistné krytie nevzťahuje (napríklad deformácia nosa bez funkčnej poruchy alebo čiastočná strata čuchu alebo chuti). Pre všetky ostatné trvalé následky úrazu, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, stanovíme ocenenie podľa trvalého následku úrazu, ktorý je v tabuľke uvedený a je mu svojou povahou a závažnosťou najviac podobný.

Aby si Oceňovacia tabuľka zachovala prehľadnosť a prijateľný rozsah, sú ocenenia niektorých trvalých následkov úrazu uvedené určitým rozpätím (intervalom). V týchto prípadoch stanovíme ocenenie trvalého následku tak, aby v rámci daného intervalu zodpovedalo jeho závažnosti (v tabuľke k týmto intervalom uvádzame príklady aj s ich presným ocenením v rámci daného intervalu).

Aký je postup v prípade niekoľkých trvalých následkov

Ak zanechá jeden úraz viac trvalých následkov, jednotlivé ocenenia trvalých následkov spočítame. Celkový súčet ocenenia následne vynásobíme koeficientom progresie stanoveným podľa Tabuľky koeficientov progresie.

Súčet ocenenia trvalých následkov jedného úrazu môže byť najviac 100 %. Súčet ocenenia niekoľkých trvalých následkov úrazu jednej časti tela nemôže byť vyšší ako ocenenie úplnej straty tejto časti tela. Ak v tabuľke nie je uvedená strata celej časti tela, stanoví sa ocenenie vo výške maxima pre čiastočnú stratu tejto časti tela.

Ak sa trvalý následok týka časti tela, ktorá bola poškodená už pred úrazom, zníži sa ocenenie o hodnotu, ktorá odpovedá oceneniu predchádzajúceho poškodenia. V ocenení za úplné stuhnutie, obmedzenie funkčnosti a porušenie nervov sú už zahrnuté obehové a trofické poruchy (napríklad svalová atrofia pri obmedzenej hybnosti končatiny a pod.).

Aby sme si rozumeli

Obmedzenie funkčnosti kĺbu

Lahké - obmedzenie pohyblivosti kĺbu o 10 – 33 % vo všetkých rovinách pohybu v porovnaní s bežným rozsahom pohybu (v prípade prstov ruky chýba do úplného zavretia dlane aspoň 1 cm, ale menej ako 3 cm) alebo akékoľvek obmedzenie funkčnosti kĺbu spôsobené trvalým poškodením jeho mäkkých tkanív

Stredne ťažké - obmedzenie pohyblivosti kĺbu o 34 – 66 % vo všetkých rovinách pohybu v porovnaní s bežným rozsahom pohybu (v prípade prstov ruky chýbajú do úplného zavretia dlane aspoň 3 cm, ale menej ako 4 cm)

Ťažké - obmedzenie pohyblivosti kĺbu o viac ako 66 % vo všetkých rovinách pohybu v porovnaní s bežným rozsahom pohybu (v prípade prstov ruky chýbajú do úplného zavretia dlane aspoň 4 cm)

simplea.

Doručovacia adresa:
P. O. Box 19
840 00 Bratislava

+421 800 900 888
info@simpleapoistovna.sk
www.simpleapoistovna.sk

Oceňovacia tabuľka

Hlava a krk

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
1	lahké neurologické poruchy po poranení hlavy	0–15
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ otras mozgu, krvácanie do mozgu alebo kontúzia mozgu (všetko bez trvalej neurologickej poruchy), epilepsia, postkomočný syndróm ◇ jednostranné poškodenie prídavného alebo rovnovážneho nervu ◇ obojstranné ochrnutie mäkkého podnebia 	<p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">15</p>
2	stredne ťažké neurologické poruchy po poranení hlavy	20–55
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ obojstranné poškodenie podjazykového alebo prídavného nervu, monoparéza ◇ hemiparéza, stredne ťažký prefrontálny syndróm 	<p style="text-align: right;">20</p> <p style="text-align: right;">30</p>
3	ťažké neurologické poruchy po poranení hlavy	60–100
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ ťažký prefrontálny syndróm, monoplégia ◇ trvalá umelá pľúcna ventilácia ◇ hemiplégia, apalický syndróm 	<p style="text-align: right;">70</p> <p style="text-align: right;">80</p> <p style="text-align: right;">100</p>
4	úplný defekt v lebečnej klenbe	1–25
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ v rozsahu 0,5 cm² ◇ v rozsahu 15 cm² a viac 	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">25</p>
5	úplná strata zraku jedného oka	35
6	čiasočná strata zraku oboch očí (iba svetlocit)	30
7	čiasočná strata zraku jedného oka (neostré videnie lepšie ako svetlocit)	5–20
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ s optimálnou okuliarovou korekciou - vízus 0,7 ◇ s optimálnou okuliarovou korekciou - vízus 0,05 ◇ schopnosť spočítat prsty len do vzdialenosti max. 1 m pred okom 	<p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: right;">15</p> <p style="text-align: right;">20</p>
8	úplná strata zraku oboch očí	100
9	čiasočná strata zraku oboch očí (iba svetlocit)	95
10	čiasočná strata zraku oboch očí (neostré videnie lepšie ako svetlocit)	5–85
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ s optimálnou okuliarovou korekciou - vízus 0,8 (obe oči) ◇ s optimálnou okuliarovou korekciou - vízus 0,3 (obe oči) ◇ s optimálnou okuliarovou korekciou - vízus 0,01 (obe oči) ◇ schopnosť spočítat prsty len do vzdialenosti max. 1 m pred očami 	<p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: right;">30</p> <p style="text-align: right;">81</p> <p style="text-align: right;">85</p>
11	zúženie zorného poľa jedného oka (vrátane poklesu očného viečka)	0–25
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ zelený zákal, koncentrické zúženie k 50° ◇ koncentrické zúženie k 30° ◇ koncentrické zúženie k 5° 	<p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">15</p> <p style="text-align: right;">25</p>

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
12	zúženie zorného poľa oboch očí (vrátane poklesu očných viečok)	10–90
	◇ zelený zákal (obe oči)	0
	◇ koncentrické zúženie k 60° (obe oči)	10
	◇ koncentrické zúženie k 30° (obe oči)	45
	◇ koncentrické zúženie k 5° (obe oči)	90
13	úplná strata šošovky jedného oka	5–25
	◇ so znášanivosťou kontaktných šošoviek aspoň 8 hodín	5
	◇ so znášanivosťou kontaktných šošoviek 4–8 hodín (do 45 rokov/inak)	15/10
	◇ so znášanivosťou kontaktných šošoviek menej ako 4 hodiny denne (do 45 rokov/inak)	20/15
	◇ s úplnou neznášanivosťou kontaktných šošoviek (do 45 rokov/inak)	25/20
14	poškodenie zrenice jedného oka s funkčnou poruchou	0–10
	◇ nepravidelný tvar až úplný zánik zrenice z dôvodu straty menej ako 1 % dúhovky	0
	◇ nepravidelný tvar až úplný zánik zrenice z dôvodu straty 1–14 % dúhovky	5
	◇ rozšírenie alebo ochrnutie zrenice	5
	◇ nepravidelný tvar až úplný zánik zrenice z dôvodu straty viac ako 50 % dúhovky	10
15	porušenie priechodnosti slzných ciest jedného oka	5–10
	◇ v oblasti horného viečka	5
	◇ v oblasti dolného viečka	10
16	nesprávne postavenie mihalnice na jednom oku, ktoré sa nedá operačne odstrániť	0–15
	◇ zmena tvaru očnej štrbiny jedného oka bez poruchy ochranej funkcie oka a bez dráždenia riasami	0
	◇ mihalnica odvrátená od oka	5
	◇ mihalnica stočená k oku	15
17	nedovieranie jedného očného viečka (lagoftalmus), ktoré sa nedá operačne odstrániť	2–10
	◇ lagoftalmus do 3 mm	2
	◇ lagoftalmus 3–7 mm	5
	◇ lagoftalmus nad 7 mm	10
18	ťažké kozmetické vady jedného oka	5–25
	◇ ptóza viečka bez prekrytia zrenice	5
	◇ deformácia očnice	10
	◇ zrasty spojovky, chýbajúca dúhovka	15
	◇ rohovková protéza po poleptaní	25
19	poškodenie trojklaného nervu	5–15
	◇ poškodenie jednej vetvy	5
	◇ poškodenie dvoch vetiev	10
	◇ poškodenie troch vetiev	15

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
20	poškodenie okohybných nervov	5–25
	◇ ľahké poškodenie	5
	◇ dvojité videnie iba pri určitom uhle pohľadu	15
	◇ dvojité videnie zvisle alebo vodorovne	25
21	poškodenie tvárového nervu	10–15
	◇ ľahké poškodenie	10
	◇ stredne ťažké poškodenie	12
	◇ ťažké poškodenie	15
22	úplná alebo čiastočná strata nosa (vrátane straty čuchu alebo chuti) alebo jeho deformácia s funkčnou poruchou	5–20
	◇ čiastočná strata bez poruchy priechodnosti	5
	◇ čiastočná strata s ťažkou poruchou priechodnosti	10
	◇ úplná strata bez poruchy dýchania	15
	◇ úplná strata s poruchou dýchania	20
23	perforácia nosovej priehradky	5
24	úplná strata čuchu alebo chuti	10
25	úplná alebo čiastočná strata sluchu jedného ucha	0–15
	◇ ľahká strata do 40 dB	0
	◇ stredne ťažká strata 41–60 dB	5
	◇ ťažká strata 61–95 dB	12
	◇ úplná strata	15
26	úplná alebo čiastočná strata sluchu oboch uší	5–40
	◇ tinnitus (obe uši)	0
	◇ ľahká strata 26–40 dB (obe uši)	5
	◇ stredne ťažká strata 41–60 dB (obe uši)	20
	◇ ťažká strata 61–95 dB (obe uši)	35
	◇ úplná strata (obe uši)	40
27	perforácia ušného bubienka	5
28	úplná strata jednej ušnice	10
29	úplná strata oboch ušníc	15
30	úplná alebo čiastočná strata jazyka (vrátane straty chuti alebo reči)	0–40
	◇ ľahká deformácia jazyka bez straty chuti a reči	0
	◇ strata menej ako štvrtiny jazyka	5
	◇ strata polovice jazyka	25
	◇ úplná strata jazyka	40
31	strata celého zuba alebo jeho časti, ak vedie k strate jeho vitality	2
32	strata časti zuba, ktorá nevedie k strate jeho vitality, alebo strata či poškodenie dočasných (mliečnych) zubov alebo zubných náhrad	0

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
33	iný trvalý následok s funkčnou poruchou po poranení tváre	10–40
	◇ obmedzenie pohyblivosti čeluste s možnosťou oddialenia čelustí do 1 cm	10
	◇ deformácia pier s trvalým výtokom slín	25
	◇ strata viac ako polovice dolnej čeluste	40
34	úplná alebo čiastočná strata hlasu alebo reči po poranení hlasiviek	10–25
	◇ čiastočná strata hlasu, poruchy hlasu	10
	◇ úplná strata hlasu alebo reči	25
35	trvalá tracheostómia	50
36	zúženie hrtana alebo priedušnice (vrátane straty hlasu alebo reči po poranení hlasiviek a tracheostómii)	15–65
	◇ ľahké zúženie bez straty hlasu a reči	15
	◇ stredne zúženie ťažké so stratou hlasu a reči	30
	◇ ťažké zúženie s trvalou tracheostómiou	65

Trup

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
37	úplná alebo čiastočná strata jedného prsníka	0–15
	◇ čiastočná strata u muža	0
	◇ čiastočná strata u ženy vo veku 46 rokov a viac	5
	◇ čiastočná strata u ženy vo veku 45 rokov a menej	10
	◇ úplná strata u ženy	15
38	obmedzenie pohyblivosti hrudníka so zrastami pľúc a steny hrudníka	5–20
	◇ ľahké obmedzenie	5
	◇ stredne ťažké obmedzenie	15
	◇ ťažké obmedzenie	20
39	iný trvalý následok po poranení pľúc (jednostranné)	15–40
	◇ ľahké obmedzenie funkcie do 10 %	15
	◇ stredne ťažké obmedzenie funkcie 10–25 %	30
	◇ ťažké obmedzenie funkcie nad 25 %	40
40	iný trvalý následok po poranení pľúc (obojsstranné)	25–100
	◇ ľahké obmedzením funkcie do 25 %	25
	◇ stredne ťažké obmedzenie funkcie 25–80 %	60
	◇ ťažké obmedzenie funkcie nad 80 %	100
41	ľahké srdcové alebo cievne poruchy spôsobené priamym poranením	10–20
	◇ komócia srdca alebo kontúzia srdca (obe s ľahkým poklesom výkonnosti)	10
	◇ aortálna disekcia bez rozšírenia aorty a bez orgánovej dysfunkcie	20

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
42	stredne ťažké srdcové alebo cievne poruchy spôsobené priamym poranením	25–45
	◇ trhlina srdcového svalu so stredne ťažkým poklesom výkonnosti	25
	◇ aortálna disekcia s rozšírením aorty a ľahkou orgánovou dysfunkciou	45
43	ťažké srdcové alebo cievne poruchy spôsobené priamym poranením	50–100
	◇ srdcová tamponáda, tenzný pneumotorax alebo hemotorax (všetko s ťažkým poklesom výkonnosti)	50
	◇ aortálna disekcia s ťažkou orgánovou dysfunkciou	100
44	úplná alebo čiastočná strata sleziny	0–15
	◇ čiastočná strata bez funkčnej poruchy	0
	◇ čiastočná strata s ľahkou funkčnou poruchou	2
	◇ čiastočná strata so stredne ťažkou funkčnou poruchou	5
	◇ čiastočná strata s ťažkou funkčnou poruchou	10
	◇ úplná strata	15
45	zúženie pažeráka	10–60
	◇ ľahké zúženie	10
	◇ stredne ťažké zúženie	30
	◇ ťažké zúženie	60
46	fistula pažeráka	30
47	porušenie funkcie brušnej steny s poruchou brušného lisu	20
48	prietrž (pruh)	0
49	iný trvalý následok po poranení tráviacich orgánov	10–100
	◇ strata časti pečene s ľahkou funkčnou poruchou	10
	◇ čiastočná nedovieravosť análnych zvieračov	15
	◇ poškodenie podžalúdkovej žľazy s funkčnou poruchou	20
	◇ strata časti pečene s ťažkou funkčnou poruchou	40
	◇ úplná nedovieravosť análnych zvieračov, trvalá kolostómia	60
	◇ trvalá ileostómia	80
50	úplná alebo čiastočná strata funkcie jednej obličky	0–25
	◇ čiastočná strata funkcie s ľahkou funkčnou poruchou	0
	◇ čiastočná strata funkcie so stredne ťažkou funkčnou poruchou	10
	◇ čiastočná strata funkcie s ťažkou funkčnou poruchou	20
	◇ úplná strata funkcie	25

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
51	úplná alebo čiastočná strata funkcie oboch obličiek	0–100
	◇ bez funkčnej poruchy	0
	◇ čiastočná strata funkcie s ľahkou funkčnou poruchou (obe obličky)	10
	◇ čiastočná strata funkcie so stredne ťažkou funkčnou poruchou (obe obličky)	40
	◇ čiastočná strata funkcie s ťažkou funkčnou poruchou (obe obličky)	80
	◇ úplná strata funkcie (obe obličky)	100
52	fistula močového mechúra alebo močovej rúry	50
53	iný trvalý následok po poranení obličiek alebo močových ciest	10–50
	◇ ľahký následok	10
	◇ stredne ťažký následok	20
	◇ ťažký následok, trvalá urostómia	50
54	ľahké poškodenie pohlavných orgánov	0–15
	◇ ľahká deformácia penisu	5
	◇ ľahká defomácia pošvy, úplná strata jedného vaječníka	10
	◇ úplná strata maternice vo veku 46 rokov a viac	15
	◇ úplná strata penisu vo veku 60 rokov a viac	15
55	stredne ťažké poškodenie pohlavných orgánov	20–30
	◇ úplná strata oboch semenníkov vo veku 46–59 rokov	25
	◇ stredne ťažká deformácia pošvy alebo strata oboch vaječníkov (vek 46 rokov a viac)	25
	◇ strata penisu vo veku 46–59 rokov	30
56	ťažké poškodenie pohlavných orgánov	35–50
	◇ úplná strata oboch semenníkov vo veku 45 rokov a menej	40
	◇ úplná strata oboch vaječníkov vo veku 45 rokov a menej	45
	◇ úplná strata penisu/maternice vo veku 45 rokov a menej	50
57	porušenie celistvosti panvového pletenca s ľahkou poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín	15–20
	◇ ženy do 45 rokov	20
	◇ ostatní	15
58	porušenie celistvosti panvového pletenca so stredne ťažkou poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín	25–35
	◇ ženy do 45 rokov	35
	◇ ostatní	25
59	porušenie celistvosti panvového pletenca s ťažkou poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín	40–55
	◇ ženy do 45 rokov	55
	◇ ostatní	40

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
60	lahké poškodenie chrbtice, miechy, miechových obalov alebo koreňov s trvalými neurologickými príznakmi	10–30
	◇ ľahké obmedzenie pohyblivosti chrbtice	10
	◇ paraparéza	30
61	stredne ťažké poškodenie chrbtice, miechy, miechových obalov alebo koreňov s trvalými neurologickými príznakmi	35–55
	◇ stredne ťažké obmedzenie pohyblivosti chrbtice	35
	◇ kvadruparéza	55
62	ťažké poškodenie chrbtice, miechy, miechových obalov alebo koreňov s trvalými neurologickými príznakmi	60–100
	◇ ťažké obmedzenie pohyblivosti chrbtice	60
	◇ kvadruplégia, paraplégia	100

Horná končatina

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
63	úplná strata hornej končatiny v laktovom kĺbe alebo nad ním	70
64	úplné stuhnutie ramenného kĺbu	30
65	lahké obmedzenie funkčnosti ramenného kĺbu	5
66	stredne ťažké obmedzenie funkčnosti ramenného kĺbu	10
67	ťažké obmedzenie funkčnosti ramenného kĺbu	18
68	náhrada ramenného kĺbu	15
69	pakláb ramennej kosti	40
70	kývavosť ramenného kĺbu	10–20
	◇ aspoň 3 vykĺbenia vyžadujúce repozíciu lekárom	10
	◇ 4 vykĺbenia vyžadujúce repozíciu lekárom	15
	◇ 5 a viac vykĺbení vyžadujúcich repozíciu lekárom	20
71	nenapraviteľné vykĺbenie akromioklavikulárne	6
72	nenapraviteľné vykĺbenie sternoklavikulárne	3
73	úplná strata hornej končatiny medzi laktovým kĺbom a zápästím	60
74	úplné stuhnutie laktového kĺbu	25
75	úplné stuhnutie rádioulnárnych kĺbov	20
76	lahké obmedzenie funkčnosti laktového kĺbu	5
77	stredne ťažké obmedzenie funkčnosti laktového kĺbu	12
78	ťažké obmedzenie funkčnosti laktového kĺbu	20
79	náhrada laktového kĺbu	15
80	pakláb vretennej kosti	30

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
81	pakľb laktovej kosti	20
82	kývavosť laktového kĺbu	15–25
	◇ ľahké obmedzenie	15
	◇ stredne ťažké obmedzenie	20
	◇ ťažké obmedzenie	25
83	úplná strata ruky v zápästí	50
84	úplná strata palca ruky alebo úplné stuhnutie všetkých jeho kĺbov	18
85	úplná strata koncového článku palca ruky	7
86	úplná strata všetkých prstov ruky okrem palca	40
87	úplná strata prsta ruky (okrem palca) alebo úplné stuhnutie všetkých jeho kĺbov	8
88	úplná strata dvoch článkov prsta ruky (okrem palca)	6
89	úplná strata koncového článku prsta ruky (okrem palca)	3
90	úplné stuhnutie zápästia	20
91	úplné stuhnutie kĺbu palca ruky	6
92	úplné stuhnutie kĺbu prsta ruky (okrem palca)	1
93	ľahké obmedzenie funkčnosti zápästia	5
94	stredne ťažké obmedzenie funkčnosti zápästia	15
95	ťažké obmedzenie funkčnosti zápästia	18
96	ľahké obmedzenie funkčnosti kĺbu prsta ruky	1
97	stredne ťažké obmedzenie funkčnosti kĺbu prsta ruky	3
98	ťažké obmedzenie funkčnosti kĺbu prsta ruky	6
99	náhrada zápästia	15
100	náhrada kĺbu prsta ruky	3
101	pakľb článkovitej kosti	15
102	kývavosť zápästia	5–15
	◇ ľahké obmedzenie	5
	◇ stredne ťažké obmedzenie	10
	◇ ťažké obmedzenie	15
103	poškodenie ramenného nervu	0–30
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	3
	◇ s čiastočným poškodením funkcie	15
	◇ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	30

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
104	poškodenie kmeňa vretenného nervu	0–35
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	3
	◇ s poruchou funkcie palcových svalov	10
	◇ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	35
105	poškodenie muskulokutanného nervu	0–30
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	3
	◇ s čiastočným poškodením funkcie (bez poruchy funkcie dvojhlavého ramen. svalu)	15
	◇ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	30
106	poškodenie kmeňa laktového nervu	0–35
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	3
	◇ s poškodením len distálnej časti nervu	25
	◇ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	35
107	poškodenie kmeňa stredového nervu	0–30
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	3
	◇ s poruchou funkcie len distálnej časti nervu	15
	◇ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	30
108	poškodenie nervov ramennej pletene	0–10
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	1
	◇ s poškodením supraclavikulárnych nervov	5
	◇ s poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	10

Dolná končatina

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
109	úplná strata dolnej končatiny v kolennom kĺbe alebo nad ním alebo deformácia stehrovej kosti s vychýlením od fyziologickej normy väčším ako 45°	60
110	úplné stuhnutie bedrového kĺbu	35
111	lahké obmedzenie funkčnosti bedrového kĺbu	10
112	stredne ťažké obmedzenie funkčnosti bedrového kĺbu	20
113	ťažké obmedzenie funkčnosti bedrového kĺbu	30
114	náhrada bedrového kĺbu	15
115	pakĺb stehrovej kosti alebo nekróza hlavice	40

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
116	skrátene dolnej končatiny o 1 cm až 4 cm	1–5
	◇ skrátene o 1 cm	1
	◇ skrátene o 2 cm	3
	◇ skrátene o 3 cm	4
	◇ skrátene o 4 cm	5
117	skrátene dolnej končatiny o 4 cm až 6 cm	5–15
	◇ skrátene o 4 cm	5
	◇ skrátene o 5 cm	10
	◇ skrátene o 6 cm	15
118	skrátene dolnej končatiny o 6 cm alebo viac	15–25
	◇ skrátene o 6 cm	15
	◇ skrátene o 7 cm	18
	◇ skrátene o 8 cm	20
	◇ skrátene o 9 cm	23
	◇ skrátene o 10 cm a viac	25
119	deformácia stehrovej kosti s vychýlením od fyziologickej normy 5° až 45°	5–60
	◇ vychýlenie 5°	5
	◇ vychýlenie 30°	30
	◇ vychýlenie 31°	32
	◇ vychýlenie 45°	60
120	strata dolnej končatiny medzi kolenným a členkovým kĺbom (v predkolení) alebo deformácia kostí predkolenia s vychýlením od fyziologickej normy väčším ako 45°	50
121	úplné stuhnutie kolenného kĺbu	25–30
	◇ v ohnutí do 20°	25
	◇ v ohnutí 21–30°	27
	◇ v ohnutí nad 30°	30
122	ľahké obmedzenie funkčnosti kolenného kĺbu	8
123	stredne ťažké obmedzenie funkčnosti kolenného kĺbu	12
124	ťažké obmedzenie funkčnosti kolenného kĺbu	25
125	náhrada kolenného kĺbu	15
126	pakĺb píšťaly	40
127	pakĺb ihlice	5
128	kývavosť kolenného kĺbu spôsobená porušením funkcie predného alebo zadného skríženého väzu	10–20
	◇ pozitívny Lachman 1. stupňa	10
	◇ pozitívny Lachman 2. stupňa	15
	◇ pozitívny Lachman 3. stupňa	20
129	kývavosť kolenného kĺbu spôsobená porušením funkcie postranného väzu	5

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
130	porušenie funkcie kolenného kĺbu po operačnom odstránení jedného menisku	3
131	iný trvalý následok s funkčnou poruchou po poranení jedného menisku	2
132	iný trvalý následok s funkčnou poruchou po poranení oboch meniskov	3
133	deformácia kostí predkolenia s vychýlením od fyziologickej normy 5° až 45°	5–50
	◇ vychýlenie 5°	5
	◇ vychýlenie 40°	40
	◇ vychýlenie 41°	42
	◇ vychýlenie 45°	50
134	úplná strata nohy v členkovom alebo Chopartovom kĺbe	30
135	úplná strata nohy v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25
136	úplná strata palca nohy so záprstnou kosťou	15
137	úplná strata palca nohy	10
138	úplná strata koncového článku palca nohy	3
139	úplná strata malíčka nohy so záprstnou kosťou	10
140	úplná strata prstu nohy (okrem palca)	2
141	úplná strata dvoch článkov alebo koncového článku prsta nohy (okrem palca)	0
142	úplné stuhnutie členkového kĺbu	20–30
	◇ v priaznivom postavení	20
	◇ v pravoúhlom postavení	25
	◇ v nepriaznivom postavení	30
143	úplné stuhnutie medzičlánkového kĺbu palca nohy	3
144	úplné stuhnutie základného kĺbu palca nohy	7
145	úplné stuhnutie kĺbu prsta nohy (okrem palca)	0
146	ľahké obmedzenie funkčnosti členkového kĺbu	5
147	stredne ťažké obmedzenie funkčnosti členkového kĺbu	10
148	ťažké obmedzenie funkčnosti členkového kĺbu	18
149	ľahké obmedzenie funkčnosti kĺbu palca nohy	1
150	stredne ťažké obmedzenie funkčnosti kĺbu palca nohy	3
151	ťažké obmedzenie funkčnosti kĺbu palca nohy	6
152	ľahké, stredne ťažké alebo ťažké obmedzenie funkčnosti kĺbu prsta nohy (okrem palca)	0
153	náhrada členkového kĺbu	15
154	kývavosť členkového kĺbu	0–20
	◇ veľmi ľahké obmedzenie	0
	◇ ľahké obmedzenie	5
	◇ stredne ťažké obmedzenie	12
	◇ ťažké obmedzenie	20

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
155	deformácia kostí členkového kĺbu alebo nohy	0–25
	◇ ľahká deformácia bez funkčnej poruchy	0
	◇ plochá noha	5
	◇ vbočená alebo vybočená noha	15
	◇ ťažká deformácia	25
156	poškodenie sedacieho nervu	0–50
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	5
	◇ s čiastočnou poruchou funkcie prstov nohy alebo členka	20
	◇ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	50
157	poškodenie stehnového nervu	0–30
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	3
	◇ s poruchou extenzie kolena	20
	◇ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	30
158	poškodenie obturatorného nervu	0–20
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	2
	◇ s čiastočným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	10
	◇ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	20
159	poškodenie kmeňa píšťalového nervu	0–35
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	3
	◇ s poruchou funkcie prstov	15
	◇ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	35
160	poškodenie kmeňa ihlicového nervu	0–30
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	3
	◇ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	30
161	poškodenie hlbokjej vetvy ihlicového nervu	0–20
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	2
	◇ s čiastočným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	10
	◇ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	20
162	poškodenie povrchovej vetvy ihlicového nervu	0–10
	◇ bez poruchy funkcie a citlivosti	0
	◇ len s poruchou citlivosti	1
	◇ s úplným poškodením funkcie všetkých inervovaných svalov	10

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
163	poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	0–15
	◇ chronický zápal kostnej drene	0
	◇ trofické poruchy svalstva predkolenia	3
	◇ trofické poruchy svalstva stehna	10
	◇ ťažká porucha	15

Ostatné

Položka	Trvalý následok úrazu	Ocenenie v %
164	plošná jazva väčšia ako 0,5 % povrchu tela	1–40
	◇ od 0,5 % do 1 % povrchu tela	1
	◇ od 1 % do 14 % povrchu tela	1–14
	◇ od 15 % do 18 % povrchu tela	16–22
	◇ od 19 % do 24 % povrchu tela	25–38
	◇ 25 % povrchu tela a viac	40
	◇ čiastočná skalpácia hlavy nad 50 % povrchu hlavy	20
	◇ úplná skalpácia hlavy	30
165	hypertrofická alebo keloidná pozdĺžna jazva na tvári alebo krku dlhšia ako 1 cm	1–20
	◇ od 1 cm do 2 cm	1
	◇ od 3 cm do 7 cm	2–6
	◇ od 8 cm do 19 cm	8–19
	◇ 20 cm a viac	20
166	hypertrofická alebo keloidná pozdĺžna jazva mimo tváre a krku dlhšia ako 8 cm	1–10
	◇ od 8 cm do 10 cm	1
	◇ od 11 cm do 12 cm	2
	◇ od 13 cm do 15 cm	3–5
	◇ od 16 cm do 24 cm	6
	◇ od 25 cm do 29 cm	7
	◇ od 30 cm do 34 cm	8
	◇ od 35 cm do 39 cm	9
	◇ 40 cm a viac	10
167	iná jazva alebo pigmentačná zmena	0

Tabuľka koeficientov progresie

Ocenenie v %	Koeficient progresie
0-15	1,00
16-20	1,50
21-30	2,00
31-40	3,00
41-50	4,00
51-60	5,00
61-70	6,00
71-80	7,00
81-90	8,00
91-100	10,00